

Ba cheart go gcuideodh na treoiríntí thíos le haon tionchar diúltach a thagann a laghdú agus le bail ghinearálta na ngnáthóig a fheabhsú. Tá sé de dhualgas ar feirmeoirí a úsáideann luibhicíd ciintíú go gculoíonn siad go hiomlán le gach reacataiocht agus go leanann treoracha an déantóra ina n-ionnláine.

Na Cineálacha Cóirithe

1. Spraeáil athfhás le luibhicíd

Feileann:

Driseacha agus Draighean

Fásann driseacha arís go minic ón gcorón nó óna riosóim i ndiaidh dóibh a bheith gearrtha siar agus tá sé deacair mar sin iad a choinneáil faoi smacht mura mbitear ach á ngearradh siar agus d'fhéadfadh go gcaithfi rud éigin breise a dhéanamh leo. D'fhéadfadh gurb é an rud breise sin ná leanacht á ngearradh, an chorón a tharraingt, diríu ar an áit a choinneáil ite agus/nó luibhicíd ar leith a úsáid.

An dteastaíonn Cead Uaim?

Ba cheart dul i dtéagmháil leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúrla sula n-úsáidtear luibhicíd i Limistéir Speisialta Caomhantais. I gcás Limistéar Speisialta Caomhantais ní mór an cead cui a bheith faighe sula gcuirtear luibhicíd amach mar gur Gniomhaiocht óna dTeastaíonn Toiliú é luibhicíd a úsáid.

Cén t-am ar cheart dom é a úsáid?

Is é an t-am is fearr le luibhicíd a úsáid ná ag deireadh an Earragh/sa Samhradh nuair a bhíonn na plandaí ag fás le buile. Laghdáitear baol athfhás sna blianta ina dhiaidh sin má chuirtear amach luibhicíd ag an tráth seo bliana.

Cén luibhicíd ar cheart dom a úsáid?

I measc na luibhicídí a úsáidtear le driseacha a choinneáil siar le linn an tséasúir fáis bíonn tárgí ina mbíonn Gliofoisát agus Tríchlóipir. Oibríonn Tríchlóipir (á dhíol mar Grazon 90 nó New terbel Brushkiller) ar phlandaí adhmadaíach maraíonn Gliofoisát beagnach chuireann tdeangaíonn sé leo. Moltar tárgí gliofoisáite níos nuai le foirmílú níos sábháilte agus níos fearr a úsáid, m.sh. Roundup Biactive nó Pro-Biactive, Barclay Gallup Biograde 360. Seachain cinn ina bhfuil aimí geire atocsaláite mar ghníomhái dromchlách mar go bhfuil siad seo níos nimhiúla.



The following guidelines are intended to help minimise any negative effects from herbicide whilst still improving the overall condition of the habitat. Where herbicides are used, it is the duty of the participant farmer to ensure that they are fully compliant with all legislation and fully follow the manufacturer's instructions.

Treatment types

1. Spraying regrowth with herbicide

Best suited for:

Briars and Blackthorn

Briars are able to regenerate from the crown or rhizomes following cutting and so can be difficult to control by cutting alone, and may require follow-up treatment. This can be by continued cutting, and targeted grazing and/or through the use of targeted herbicides.

Do I need Permission?

You should contact NPWS (National Parks and Wildlife Service) prior to commencement of any works using herbicide on Special Areas of Conservation (SACs). Applications of herbicide within SAC's is an Activity Requiring Consent, so appropriate consents must be in place before use.

When should I do this?

The most effective time for herbicide use is in the late spring/summer when the plant is actively growing. Herbicide application at this time reduces the likelihood of regrowth in subsequent years.

Which herbicide?

Herbicides used to control briars during the growing season include products containing Glyphosate or Triclopyr. Triclopyr (sold as Grazon 90 or New Terbel Brushkiller) is selective to woody plants whilst Glyphosate will kill most plants it comes in contact with. Newer glyphosate products with improved, safer formulations are recommended e.g. Roundup Biactive or Pro-Biactive, Barclay Gallup Biograde 360. Avoid using formulations containing ethoxylated tallow amines as the surfactant, because they are more toxic.

Cén caolúchán ar cheart dom a úsáid?

I gcás spraeáil le cnapsac, úsáid uisce glan leis an luibhicíd a thanúchán, de réir mar a threoraíonn an lipéad. Ansín lean treoracha an déantóra ó thaobh an ama chuí le paisti talún atá spraeáilte a innilt.

Céard má bhíonn báisteach ann nó má bhíonn sé an-te?

Moltar gan spraeáil má bhíonn báisteach gealalta sna chéad 6 uair an chloig atá ag teacht mar go rithfidh an luibhicíd den talamh agus ní oibreoidh i gceart. Ná téirigh ag spraeáil in aimsir the - dófaidh na bileoga agus caillfear iad ach ní dhéanfar aon dochar do na rútaí agus fásfaidh na toim arís.

Cén bealach is fearr a n-oibreoidh sé dom?

Sula n-úsáidtear luibhicíd ba cheart scrobarnach driseacha agus draighin a ghearradh agus fáil réidh leis an ábhar gearrtha. Níor cheart iad a ghearradh ach sa tréimhse idir 1 Meán Fómhair agus 28/29 Feabhra (de réir an dí agus séasúr neadaithe na n-éan). Ba cheart gurb é an spraeáil an rogha deireanach a d'úsáidí nuair atá athghearradh agus innilt úsáidte ar dtús mar chórais smachta. Is fearr an spraeáil a dhéanamh nuair a bhíonn na driseacha le linn tsoái ag fás arís mar go bhfeadfad sé a bheith níos deacra ina dhiaidh sin díriú isteach ar reathairí in éineacht le go mbeadh riosca níos mó ann do na speics eile plandaí. Le caitheadh sprae a laghdú ba cheart cóm spraeála le treo-shoc a úsáid. Is féidir iad seo a cheannach níos iad a dhéanamh as coimeádán pláisteach.

Le toradh maith a fháil ní mór an sprae a chur ar chuireann phíosa de na duilleoga (an oiread agus a fhliuchas iad), spraeáil an planda le go bhfuil sé ar fad fliuch ach nach bhfuil an sprae ag sileadh de.

Cé mhéad babhta ar chóir dom iad a ath-spraeáil?

Ba cheart súil a choinneáil ar an áit a bhíonn spraeáilte le linn an tséasúir fáis. Seans go dteastóidh spraeáil anonn is anall ag amanna difríocht sa séasúr fáis le fonn rudá a smachtú ceart.

2. Luibhicíd a chuimilt orthu – athfhás & toim bheaga

Feileann

Coll agus Draighean

An dteastaíonn Cead Uaim?

Ba cheart dul i dtéagmháil leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúrla sula n-úsáidtear luibhicíd i Limistéar Speisialta Caomhantais. I gcás Limistéar Speisialta Caomhantais ní mór an cead cui a bheith faighe sula gcuirtear luibhicíd amach mar gur Gniomhaiocht óna dTeastaíonn Toiliú é luibhicíd a úsáid.

Cén t-am ar cheart dom é seo a dhéanamh?

Ba cheart luibhicíd a chuimilt ar na bileoga nuair a bhíonn bonn maith fáis faoin tom, sé sin nuair a bhíonn na bileoga oscailte ar fad agus sula dtosáonáil síad ag lobhadh (Earrach go Fómhar). Athróidh an t-am beacht ag brath ar thús na séasúr.

Cén fhad ar cheart dom athfhás a fhágáil roimh spraeáil?

Coll: Meitheamh go deireadh Lúnasa

Draighean: Tús na Bealtaine go tús Lúnasa

Mura gcuimleártar an luibhicíd ar an athfhás go dtí go mbíonn sé 50cm ar fad oibríonn sé níos fearr mar go mbíonn na bileoga níos mó le níos mó den luibhicíd a shú isteach leis an rúta a mharó. Beidh difríocht sa tréimhse a thíogaídh sé seo. Mar threoir ginearálta ba cheart an chuid is mó athfhás a fhágáil ar feadh bliana ar a laghad sula gcuimleártar é le luibhicíd. Ach má bhíonn an t-athfhás sciobtha d'fhéadfai é a dhéanamh an chéad samhradh i ndiaidh dó a bheith gearrtha.

What dilution should I use?

Dilute the herbicide with clean water as per the label instruction for knapsack treatment. Follow the manufacturer's instructions regarding grazing areas after spraying.

What if it is raining or very hot?

You are advised not to spray if rain is forecast in next 6 hours as the herbicide will be washed off and so will be less effective. Do not spray in hot weather - the leaves will scorch and die but roots will not be killed so the bushes will regrow.

How do I get the best results?

Before herbicide treatment, briar and blackthorn scrub should be cut and the cut material removed. Cutting should only be carried out during the period 1st September to the 28/29th February (in accordance with the bird nesting season and the law). Spraying should be the last resort of control after re-cutting or grazing. Targeted spraying is best achieved when the briar regrowth is at the vegetation stage and before runners become established. It can be more difficult to selectively spray runners and the risk to other plant species is increased. To reduce spray drift, a spray cone should be used with a direction nozzle. These can be purchased or made from a plastic container.



Cén luibhicíd?

Úsáid luibhicíd Gliofoisáit-bhunaithe nó, má tá difríocht, an luibhicíd atá sonraithe sa gcead atá agat ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúrla i leith Gníomh Infhógartha nó Gníomhaiocht a Éilíon Toiliú. Moltar tárgí gliofoisáite níos nuai le foirmílú níos sábháilte agus níos fearr a úsáid, m.sh. Roundup Biactive nó Pro-Biactive, Barclay Gallup Biograde 360. Seachain cinn ina bhfuil aimí geire atocsaláite mar ghníomhái dromchlách mar go bhfuil siad seo níos nimhiúla.

Which herbicide?

Use a glyphosate-based herbicide or, if different, the herbicide stipulated in your permission from the NPWS for a Notifiable Action or Activity Requiring Consent. Newer glyphosate products with improved, safer formulations are recommended e.g. Roundup Biactive or Pro-Biactive, Barclay Gallup Biograde 360. Avoid using formulations containing ethoxylated tallow amines as the surfactant because they are more toxic.

What dilution should I use?

Dilute the herbicide with clean water. The dilution is usually 1 part herbicide to 2 parts water (a 33% solution) but you should always check with manufacturer.

How do I apply the herbicide?

Use a hand-held wiper e.g. Microwipe. These can be ordered through your local agricultural supplier.

How do I get the best results?

Follow the instructions that came with your wiper. Check that the herbicide is flowing sufficiently to keep the rope wet at all times but not so fast that there is excess dripping. Sweep the rope-wick on the wiper backwards and forwards across the leaves of the bush in order to get herbicide on both sides. Ensure that the herbicide is applied to as much of the bush/regrowth as possible. Once wiped the herbicide should be visible as a slight sheen on the leaves; it should not be applied so heavily that it begins to run off. Avoid contact between the rope wick and the surrounding vegetation, i.e. grass and flowers, or these will be killed too. Place the head of the wiper in a bucket or turn the wiper upside down to prevent dripping when moving between bushes and when temporarily not in use.

Cé mhéad babhta ar chóir dom iad a ath-spraeáil?

Braithfidh sé seo ar cé chomh maith agus a bhíonn ag éirí leat. Is minic go mbíonn roinnt tom fágtha amach níos nach mbíonn chuireann phíosa cuimleártar é ag fad. Tóigfaidh sé tréimhse 3-4 bliana uilig. Beidh laghdú mór ar an méid go gcaithfidh tú dul ina gcionn aris i ndiaidh an chéad bliain.

How often should I retreat?

How often you have to retreat will depend on your success rate. It is normal to miss some bushes when wiping and for others not to be fully wiped. Your re-treatment programme will need to be carried out over 3-4 years. After the first year, the amount that needs retreating will reduce markedly.